


適応疾患:肺がん

1クール：21日

| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 1日目 | — | — | — | — | 21日目 |
|---------|----------------------|---------|-----|---|---|---|---|------|
| パクリタキセル | 200mg/m ² | 点滴(3時間) | ● | | | | | |
| カルボプラチン | 6AUC | 点滴(1時間) | ● | | | | | |

1日目

生食100mL+デキサメタゾン19.8mg+ファモチジン20mg



| 発現する可能性のある副作用 | 副作用に対して注意すること |
|---------------|--|
| 過敏症 | 熱感や痛み、かゆみ、発疹、息苦しいなどの症状が出た場合は、すぐに周囲にいるスタッフに伝えてください。 |
| 食欲不振 | 食事はあっさりしたものがおすすめです。消化の良い物を選びましょう。 |
| 悪心・嘔吐 | 処方されている吐き気止めはしっかり服用しましょう。頻りに悪心・嘔吐が起こる場合は、すぐに受診しましょう。 |
| 口内炎 | 口内を清潔に保つことが大切です。柔らかい毛の歯ブラシを選び、きちんと磨きましょう。 |
| 倦怠感 | 十分な休息・睡眠をとりましょう。無理をせずに周囲の人に相談しましょう。 |
| 脱毛 | 頭皮を清潔に保つためにきちんと洗髪をしましょう。 |
| 白血球減少 | 外出後などの手洗い、うがいをしっかり行いましょう。人ごみを避け、外出する時はマスクを着用しましょう。 |
| 血小板減少 | 血が止まりにくくなったり、出血しやすくなったりします。歯ブラシは柔らかいものを使い、鼻をかむときは強くかまないようにしましょう。 |
| しびれ | 箸が上手く使えない、字が上手く書けない、新聞がめくりにくいなどの症状が出現する場合があります。 |

注意点：パクリタキセルにアルコールが含まれているため、点滴後の自動車等の運転は避けてください。