

適応疾患:乳がん

1クール: 21日

総コース: 4コース

薬品名	投与量	投与方法	1日目	—	—	—	—	21日目
ドキソルビシン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴(30分)	●					
エンドキサン	600mg/m <sup>2</sup>	点滴(30分)	●					

## 1日目

アロキシ+ テキサート 9.9mg	生食100mL +ドキソルビシン 60mg/m <sup>2</sup>	生食100mL +エンドキサン 600mg/m <sup>2</sup>
-------------------------	--	--

30分      30分

発現する可能性のある副作用	副作用に対して注意すること
食欲不振	食事はあっさりしたものがおすすめです。消化の良い物を選びましょう。
恶心・嘔吐	処方されている吐き気止めはしっかり服用しましょう。頻繁に恶心・嘔吐が起こる場合は、すぐに受診しましょう。
口内炎	口内を清潔に保つことが大切です。柔らかい毛の歯ブラシを選び、きちんと磨きましょう。
倦怠感	十分な休息・睡眠をとりましょう。無理をせずに周囲の人と相談しましょう。
脱毛	頭皮を清潔に保つためにきちんと洗髪をしましょう。
白血球減少	外出後などの手洗い、うがいをしっかり行いましょう。人ごみを避け、外出する時はマスクを着用しましょう。
血小板減少	血が止まりにくくなったり、出血しやすくなったりします。歯ブラシは柔らかいものを使い、鼻をかむときは強くかまないようにしましょう。
出血性膀胱炎	点滴後、水分摂取を励行してください。また、こまめな排尿を心がけてください。