

レジメン名

AMR

適応疾患:肺がん

1クール:21日


総コース:可及的

薬品名	投与量	投与方法	1日目	2日目	3日目	—	—	21日目
カルセド	45mg/m ²	静注	●	●	●			


1日目

2・3日目

アロキシ静注バッグ+
デキサート9.9mg(30分)



生食100mL(30分)



生食20mL+
カルセド45mg/m²(静注)

生食20mL+
カルセド45mg/m²(静注)

発現する可能性のある副作用	副作用に対して注意すること
食欲不振	食事はあっさりしたものがおすすめです。消化の良い物を選びましょう。
悪心・嘔吐	処方されている吐き気止めはしっかり服用しましょう。頻繁に悪心・嘔吐が起こる場合は、すぐに受診しましょう。
倦怠感	十分な休息・睡眠をとりましょう。無理をせずに周囲の人に相談しましょう。
脱毛	頭皮を清潔に保つためにきちんと洗髪をしましょう。
白血球減少	外出後などの手洗い、うがいをしっかり行いましょう。人ごみを避け、外出する時はマスクを着用しましょう。
血小板減少	血が止まりにくくなったり、出血しやすくなったりします。歯ブラシは柔らかいものを使い、鼻をかむときは強くかまないようにしましょう。
心機能障害	動悸や息切れが起こりやすくなったと感じたらお伝え下さい