

レジメン名

Ramucirumab+PAC


適応疾患:胃がん

1クール：28日


総コース：可及的

薬品名	投与量	投与方法	1日目	—	8日目	—	15日目	—	28日目
サイラムザ	8mg/kg	点滴(1時間)	●				●		
パクリタキセル	80mg/m ²	点滴(1時間)	●		●		●		

1・15日目



8日目



発現する可能性のある副作用	副作用に対して注意すること
過敏症	熱感や痛み、かゆみ、発疹、息苦しいなどの症状が出た場合は、すぐに周囲にいるスタッフに伝えてください。
食欲不振	食事はあっさりしたものがおすすめです。消化の良い物を選びましょう。
悪心・嘔吐	処方されている吐き気止めはしっかり服用しましょう。頻繁に悪心・嘔吐が起こる場合は、すぐに受診しましょう。
口内炎	口内を清潔に保つことが大切です。柔らかい毛の歯ブラシを選び、きちんと磨きましょう。
下痢	脱水を避けるために、十分な水分摂取を心がけましょう。
倦怠感	十分な休息・睡眠をとりましょう。無理をせずに周囲の人に相談しましょう。
脱毛	頭皮を清潔に保つためにきちんと洗髪をしましょう。
白血球減少	外出後などの手洗い、うがいをしっかり行いましょう。人ごみを避け、外出する時はマスクを着用しましょう。
血小板減少	血が止まりにくくなったり、出血しやすくなったりします。歯ブラシは柔らかいものを使い、鼻をかむときは強くかまないようにしましょう。
しびれ	箸が上手く使えない、字が上手く書けない、新聞がめくりにくいなどの症状が出現する場合があります。
高血圧	自宅で血圧の定期的な測定が推奨されます。高くなる場合はスタッフにお伝えください。
出血傾向	出血しやすくなったり、傷の治りが遅くなったりすることがあります。