

レジメン名

CDDP+VP-16(short hydration)


適応疾患:肺がん(小細胞)

1クール：21日


総コース：4コース

薬品名	投与量	投与方法	1日目	2日目	3日目	—	—	21日目
シスプラチン	80mg/m ²	点滴(1時間)	●					
エトポシド	100mg/m ²	点滴(90分)	●	●	●			

1日目



2・3日目



発現する可能性のある副作用	副作用に対して注意すること
過敏症	熱感や痛み、かゆみ、発疹、息苦しいなどの症状が出た場合は、すぐに周囲にいるスタッフに伝えてください。
食欲不振	食事はあっさりしたものがおすすめです。消化の良い物を選びましょう。
悪心・嘔吐	処方されている吐き気止めはしっかり服用しましょう。頻繁に悪心・嘔吐が起こる場合は、すぐに受診しましょう。
倦怠感	十分な休息・睡眠をとりましょう。無理をせずに周囲の人に相談しましょう。
脱毛	頭皮を清潔に保つためにきちんと洗髪をしましょう。
白血球減少	外出後などの手洗い、うがいをしっかり行いましょう。人ごみを避け、外出する時はマスクを着用しましょう。
血小板減少	血が止まりにくくなったり、出血しやすくなったりします。歯ブラシは柔らかいものを使い、鼻をかむときは強くかまないようにしましょう。
腎障害	水分補給と電解質補正を行っていきます。点滴当日から3日ほど水分摂取を励行して下さい。