

レジメン名

CDDP+GEM(short hydration)

適応疾患:肺がん(非小細胞)

1クール：28日

総コース：4コース

薬品名	投与量	投与方法	1日目	—	8日目	—	15日目	—	28日目
シスプラチン	80mg/m ²	点滴(1時間)	●						
ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴(30分)	●		●		●		

1日目



30分

1時間

8・15日目

生食50mL + デキサト 6.6mg



30分

発現する可能性のある副作用	副作用に対して注意すること
食欲不振	食事はあっさりしたものがおすすめです。消化の良い物を選びましょう。
悪心・嘔吐	処方されている吐き気止めはしっかり服用しましょう。頻りに悪心・嘔吐が起こる場合は、すぐに受診しましょう。
倦怠感	十分な休息・睡眠をとりましょう。無理をせずに周囲の人に相談しましょう。
白血球減少	外出後などの手洗い、うがいをしっかり行いましょう。人ごみを避け、外出する時はマスクを着用しましょう。
血小板減少	血が止まりにくくなったり、出血しやすくなったりします。歯ブラシは柔らかいものを使い、鼻をかむときは強くかまないようにしましょう。
血管痛	投与中に血管に刺激を感じる場合があります。痛みがある場合はスタッフまでお伝えください。
腎障害	水分補給と電解質補正を行っていきます。点滴当日から3日ほど水分摂取を励行して下さい。