

レジメン名

CPT-11(B)

適応疾患:胃がん

1クール:49日

総コース:可及的

薬品名	投与量	投与方法	1日目	—	15日目	—	29日目	—	—	49日目
イリノテカン	150mg/m ²	点滴(90分)	●		●		●			

1・15・29日目

70μg + デキスト 9.9mg	5%ブドウ糖液500mL + イリノテカン100mg/m ²
----------------------------	---

90分



発現する可能性のある副作用	副作用に対して注意すること
食欲不振	食事はあっさりしたものがおすすめです。消化の良い物を選びましょう。
悪心・嘔吐	処方されている吐き気止めはしっかり服用しましょう。頻繁に悪心・嘔吐が起こる場合は、すぐに受診しましょう。
口内炎	口内を清潔に保つことが大切です。柔らかい毛の歯ブラシを選び、きちんと磨きましょう。
下痢	脱水を避けるために、十分な水分摂取を心がけましょう。
倦怠感	十分な休息・睡眠をとりましょう。無理をせずに周囲の人に相談しましょう。
脱毛	頭皮を清潔に保つためにきちんと洗髪をしましょう。
白血球減少	外出後などの手洗い、うがいをしっかり行いましょう。人ごみを避け、外出する時はマスクを着用しましょう。
血小板減少	血が止まりにくくなったり、出血しやすくなったりします。歯ブラシは柔らかいものを使い、鼻をかむときは強くかまないようにしましょう。