

レジメン名

S-1+DOC

適応疾患:胃がん


1クール: 21日

総コース: 8コース

薬品名	投与量	投与方法	1日目	—	—	14日目	—	21日目
ドセタキセル	40mg/m ²	点滴(60分)	●					
エスワン	80-120mg/日	内服(1日2回)	→					

1日目

生食50mL + ドセタキセル6.6mg



1時間



発現する可能性のある副作用	副作用に対して注意すること
食欲不振	食事はあっさりしたものがおすすめです。消化の良い物を選びましょう。
悪心・嘔吐	処方されている吐き気止めはしっかり服用しましょう。頻繁に悪心・嘔吐が起こる場合は、すぐに受診しましょう。
口内炎	口内を清潔に保つことが大切です。柔らかい毛の歯ブラシを選び、きちんと磨きましょう。
下痢	脱水を避けるために、十分な水分摂取を心がけましょう。
倦怠感	十分な休息・睡眠をとりましょう。無理をせずに周囲の人に相談しましょう。
脱毛	頭皮を清潔に保つためにきちんと洗髪をしましょう。
白血球減少	外出後などの手洗い、うがいをしっかり行いましょう。人ごみを避け、外出する時はマスクを着用しましょう。
血小板減少	血が止まりにくくなったり、出血しやすくなったりします。歯ブラシは柔らかいものを使い、鼻をかむときは強くかまないようにしましょう。
しびれ	箸が上手く使えない、字が上手く書けない、新聞がめくりにくいなどの症状が出現する場合があります。
色素沈着	肌が黒くなる場合がありますので、長袖の服を着たり帽子をかぶるなど、紫外線対策を行いましょう。
浮腫み	下肢などに浮腫み症状があらわれる可能性があります。定期的な体重の測定をお願いします。