

## レジメン名


## FOLFIRI + BV

適応疾患:大腸がん

1クール: 14日

総コース: 可及的

薬品名	投与量	投与方法	1日目	—	—	—	—	14日目
アバスチン	5mg/kg	点滴(90~30分)	●					
イリノテカン	180mg/m <sup>2</sup>	点滴(90分)	●					
レボリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	●					
5-FU 急速	400mg/m <sup>2</sup>	点滴(5分)	●					
5-FU 持続	3000mg/m <sup>2</sup>	点滴(46時間)	●					



発現する可能性のある副作用	副作用に対して注意すること
食欲不振	食事はあっさりしたものがおすすめです。消化の良い物を選びましょう。
悪心・嘔吐	処方されている吐き気止めはしっかり服用しましょう。頻繁に悪心・嘔吐が起こる場合は、すぐに受診しましょう。
口内炎	口内を清潔に保つことが大切です。柔らかい毛の歯ブラシを選び、きちんと磨きましょう。
下痢	脱水を避けるために、十分な水分摂取を心がけましょう。
倦怠感	十分な休息・睡眠をとりましょう。無理をせずに周囲の人と相談しましょう。
脱毛	頭皮を清潔に保つためにきちんと洗髪をしましょう。
白血球減少	外出後などの手洗い、うがいをしっかり行いましょう。人ごみを避け、外出する時はマスクを着用しましょう。
血小板減少	血が止まりにくくなったり、出血しやすくなったりします。歯ブラシは柔らかいものを使い、鼻をかむときは強くかまないようにしましょう。
高血圧	自宅で血圧の定期的な測定が推奨されます。高くなる場合はスタッフにお伝えください。
出血傾向	出血し易くなったり、傷の治りが遅くなったりすることがあります。