


適応疾患:大腸がん

1クール：14日

総コース：可及的

薬品名	投与量	投与方法	1日目	—	—	—	—	14日目
ベクティビックス	6mg/kg	点滴(1時間)	●					
エルプラット	85mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	●					
レポリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	●					
5-FU 急速	400mg/m <sup>2</sup>	点滴(5分)	●					
5-FU 持続	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴(46時間)	●					



発現する可能性のある副作用	副作用に対して注意すること
過敏症	熱感や痛み、かゆみ、発疹、息苦しいなどの症状が出た場合は、すぐに周囲にいるスタッフに伝えてください。
食欲不振	食事はあっさりしたものがおすすめです。消化の良い物を選びましょう。
悪心・嘔吐	処方されている吐き気止めはしっかり服用しましょう。頻繁に悪心・嘔吐が起こる場合は、すぐに受診しましょう。
口内炎	口内を清潔に保つことが大切です。柔らかい毛の歯ブラシを選び、きちんと磨きましょう。
下痢	脱水を避けるために、十分な水分摂取を心がけましょう。
倦怠感	十分な休息・睡眠をとりましょう。無理をせずに周囲の人に相談しましょう。
白血球減少	外出後などの手洗い、うがいをしっかり行いましょう。人ごみを避け、外出する時はマスクを着用しましょう。
血小板減少	血が止まりにくくなったり、出血しやすくなったりします。歯ブラシは柔らかいものを使い、鼻をかむときは強くかまないようにしましょう。
しびれ	箸が上手く使えない、字が上手く書けない、新聞がめくりにくいなどの症状が出現する場合があります。
皮膚障害	乾燥を防ぐために保湿剤をきちんと使いましょう。処方されているお薬は指示通りに使いましょう。

注意点：氷や冷たい飲み物・食べ物は避けてください。