

レジメン名 Weekly CBDCA+PAC(放射線併用)

適応疾患:肺がん (非小細胞)

1クール: 42日

総コース: 1コース

薬品名	投与量	投与方法	1日目	—	8日目	—	15日目	—
パクリタキセル	40mg/m ²	点滴(1時間)	●		●		●	
カルボプラチン	2AUC	点滴(1時間)	●		●		●	


薬品名	投与量	投与方法	22日目	—	29日目	—	35日目	—	42日目
パクリタキセル	40mg/m ²	点滴(1時間)	●		●		●		
カルボプラチン	2AUC	点滴(1時間)	●		●		●		

※根治的胸部放射線照射 60Gy/30回を併用

※化学放射線療法終了後、TJ療法を2サイクル追加する。

1・8・15・22・29・36日目

生食100mL+デキストラン9.9mg+ファモチジン20mg



発現する可能性のある副作用	副作用に対して注意すること
過敏症	熱感や痛み、かゆみ、発疹、息苦しいなどの症状が出た場合は、すぐに周囲にいるスタッフに伝えてください。
食欲不振	食事はあっさりしたものがおすすめです。消化の良い物を選びましょう。
悪心・嘔吐	処方されている吐き気止めはしっかり服用しましょう。頻繁に悪心・嘔吐が起こる場合は、すぐに受診しましょう。
倦怠感	十分な休息・睡眠をとりましょう。無理をせずに周囲の人に相談しましょう。
脱毛	頭皮を清潔に保つためにきちんと洗髪をしましょう。
白血球減少	外出後などの手洗い、うがいをしっかり行いましょう。人ごみを避け、外出する時はマスクを着用しましょう。
血小板減少	血が止まりにくくなったり、出血しやすくなったりします。歯ブラシは柔らかいものを使い、鼻をかむときは強くかまないようにしましょう。
しびれ	箸が上手く使えない、字が上手く書けない、新聞がめくりにくいなどの症状が出現する場合があります。