

レジメン名

DOC+CDDP(放射線併用)

適応疾患:肺がん (非小細胞)

1クール:28日

総コース:2コース

| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 1日目 | — | 8日目 | — | — | 28日目 |
|--------|---------------------|---------|-----|---|-----|---|---|------|
| ドセタキセル | 40mg/m ² | 点滴(1時間) | ● | | ● | | | |
| シスプラチン | 40mg/m ² | 点滴(1時間) | ● | | ● | | | |

※根治的胸部放射線照射 60Gy/30回を併用

1・8日目

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|---|----------------------|
| アロキシバッグ 1袋 +デキサメタゾン9.9mg | 生食250mL + ドセタキセル40mg/m ² | 生食500mL +KCL10meq +硫酸Mg補正液8meq | マソットール 300mL | 生食250mL + シスプラチン40mg/m ² | 生食500mL +KCL10meq |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|---|----------------------|

1時間

1時間

| 発現する可能性のある副作用 | 副作用に対して注意すること |
|---------------|--|
| 食欲不振 | 食事はあっさりしたものがおすすめです。消化の良い物を選びましょう。 |
| 悪心・嘔吐 | 処方されている吐き気止めはしっかり服用しましょう。頻りに悪心・嘔吐が起こる場合は、すぐに受診しましょう。 |
| 口内炎 | 口内を清潔に保つことが大切です。柔らかい毛の歯ブラシを選び、きちんと磨きましょう。 |
| 下痢 | 脱水を避けるために、十分な水分摂取を心がけましょう。 |
| 倦怠感 | 十分な休息・睡眠をとりましょう。無理をせずに周囲の人に相談しましょう。 |
| 脱毛 | 頭皮を清潔に保つためにきちんと洗髪をしましょう。 |
| 白血球減少 | 外出後などの手洗い、うがいをしっかり行いましょう。人ごみを避け、外出する時はマスクを着用しましょう。 |
| 血小板減少 | 血が止まりにくくなったり、出血しやすくなったりします。歯ブラシは柔らかいものを使い、鼻をかむときは強くかまないようにしましょう。 |
| しびれ | 箸が上手く使えない、字が上手く書けない、新聞がめくりにくいなどの症状が出現する場合があります。 |
| 浮腫み | 下肢などに浮腫み症状があらわれる可能性があります。定期的な体重の測定をお願いします。 |
| 腎障害 | 水分補給と電解質補正を行っていきます。点滴当日から3日ほど水分摂取を励行して下さい。 |