

レジメン名

PAC-weekly+BV

適応疾患:乳がん


1クール:28日

総コース:可及的

薬品名	投与量	投与方法	1日目	—	8日目	—	15日目	—	28日目
パクリタキセル	90mg/m ²	点滴(1時間)	●		●		●		
アバスチン	10mg/kg	点滴(90分~30分)	●				●		

1・15日目


生食100mL
+デキザト9.9mg
+フェモフィソ20mg



レスタミンコーワ錠5錠内服

8日目

生食100mL
+デキザト9.9mg
+フェモフィソ20mg



レスタミンコーワ錠5錠内服

発現する可能性のある副作用	副作用に対して注意すること
過敏症	熱感や痛み、かゆみ、発疹、息苦しいなどの症状が出た場合は、すぐに周囲にいるスタッフに伝えてください。
食欲不振	食事はあっさりしたものがおすすめです。消化の良い物を選びましょう。
悪心・嘔吐	処方されている吐き気止めはしっかり服用しましょう。頻繁に悪心・嘔吐が起こる場合は、すぐに受診しましょう。
倦怠感	十分な休息・睡眠をとりましょう。無理をせずに周囲の人に相談しましょう。
脱毛	頭皮を清潔に保つためにきちんと洗髪をしましょう。
白血球減少	外出後などの手洗い、うがいをしっかり行いましょう。人ごみを避け、外出する時はマスクを着用しましょう。
血小板減少	血が止まりにくくなったり、出血しやすくなったりします。歯ブラシは柔らかいものを使い、鼻をかむときは強くかまないようにしましょう。
しびれ	箸が上手く使えない、字が上手く書けない、新聞がめくりにくいなどの症状が出現する場合があります。
高血圧	自宅で血圧の定期的な測定が推奨されます。高くなる場合はスタッフにお伝えください。
出血傾向	出血しやすくなったり、傷の治りが遅くなったりすることがあります。
蛋白尿	尿中に蛋白が出るようになったりします。