

レジメン名

CDDP(子宮頸癌)

適応疾患:子宮頸癌

1クール:7日


総コース:5~6コース

| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 1日目 | — | — | — | 7日目 |
|--------|---------------------|---------|-----|---|---|---|-----|
| シスプラチン | 40mg/m ² | 点滴(2時間) | ● | | | | |

※放射線療法併用

1日目

アロキシバグ1袋+デキサト9.9mg フロセミド注射液20mg 静注



| 発現する可能性のある副作用 | 副作用に対して注意すること |
|---------------|--|
| 食欲不振 | 食事はあっさりしたものがおすすめです。消化の良い物を選びましょう。 |
| 悪心・嘔吐 | 処方されている吐き気止めはしっかり服用しましょう。頻繁に悪心・嘔吐が起こる場合は、すぐに受診しましょう。 |
| 倦怠感 | 十分な休息・睡眠をとりましょう。無理をせずに周囲の人に相談しましょう。 |
| 白血球減少 | 外出後などの手洗い、うがいをしっかり行いましょう。人ごみを避け、外出する時はマスクを着用しましょう。 |
| 血小板減少 | 血が止まりにくくなったり、出血しやすくなったりします。歯ブラシは柔らかいものを使い、鼻をかむときは強くかまないようにしましょう。 |
| 血管痛 | 投与中に血管に刺激を感じる場合があります。痛みがある場合はスタッフまでお伝えください。 |
| 腎障害 | 水分補給と電解質補正を行っていきます。点滴当日から3日ほど水分摂取を励行して下さい。 |