

適応疾患:子宮体癌

1クール:21日

総コース数:6コース

薬品名	投与量	投与方法	1日目	—	—	—	—	21日目
ドキシソルビシン	60mg/m ²	点滴(1時間)	●					
シスプラチン	50mg/m ²	点滴(1時間)	●					

1日目

アロキシ バッグ +デサト 9.9mg	生食100mL + ドキシソルビシン 60mg/m ²	生食500mL +KCL10meq +硫酸Mg補正液 8meq	マニトール 300mL	生食 250mL + シスプラチン 50mg/m ²	生食500mL +KCL10meq
------------------------------	---	--	----------------	---	----------------------

1時間
↔1時間
↔

発現する可能性のある副作用	副作用に対して注意すること
食欲不振	食事はあっさりしたものがおすすめです。消化の良い物を選びましょう。
悪心・嘔吐	処方されている吐き気止めはしっかり服用しましょう。頻繁に悪心・嘔吐が起こる場合は、すぐに受診しましょう。
口内炎	口内を清潔に保つことが大切です。柔らかい毛の歯ブラシを選び、きちんと磨きましょう。
倦怠感	十分な休息・睡眠をとりましょう。無理をせずに周囲の人に相談しましょう。
脱毛	頭皮を清潔に保つためにきちんと洗髪をしましょう。
白血球減少	外出後などの手洗い、うがいをしっかり行いましょう。人ごみを避け、外出する時はマスクを着用しましょう。
血小板減少	血が止まりにくくなったり、出血しやすくなったりします。歯ブラシは柔らかいものを使い、鼻をかむときは強くかまないようにしましょう。
心機能障害	動悸や息切れが起こりやすくなったと感じたらお伝え下さい
腎障害	水分補給と電解質補正を行っていきます。点滴当日から3日ほど水分摂取を励行して下さい。