


全身麻酔で硝子体手術または硝子体+白内障の手術を受けられる方へ
(右・左) 眼 (硝子体手術+白内障手術・硝子体のみ)

患者IDラベル _____ 主治医 _____ 令和7年9月作成

月日/病日	月 日 入院日	月 日 手術まで	月 日 手術後	月 日 術後1日目	月 日 術後2日目以降
1. 治療に関して	・3日前から手術する目の菌を減らすため、点眼を行います。 点眼薬: ベガモックス 月 日から ☐朝食時 ☐昼食時 ☐夕食時 ☐寝る前 	・点滴の針を刺します。点滴は手術に行く前から始めます。 ・11:30から点眼を開始します。手術する目に30分ごとに2種類を点眼します。 点眼薬: ミドリnP ネオシネジン ・全身麻酔中に血栓ができることを予防するため弾性ストッキングを装着します	・翌朝の診察まで眼帯をはずさないで下さい ・手術後は医師の指示で心電図モニター、酸素投与を行う予定です 	・診察が済んだら眼帯がはずれます。 ・主治医の指示で退院日が決まります。 ・点眼方法を覚えてもらいます。点眼は3種類あります。各点眼は5分の間隔を空けて下さい。 点眼薬: リンデロン ベガモックス 1日4回 ☐朝食時 ☐昼食時 ☐夕食時 ☐寝る前 点眼薬: ブロムフェナク 1日2回 ☐朝食時 ☐夕食時 ※朝の診察後より点眼を開始して下さい。	・点眼を続けて下さい 点眼薬: リンデロン ベガモックス 1日4回 ☐朝食時 ☐昼食時 ☐夕食時 ☐寝る前 点眼薬: ブロムフェナク 1日2回 ☐朝食時 ☐夕食時 
2. 検温	・入院後に行います。	・手術前に行います。	・手術後に行います。	・必要に応じて行います。	
3. 食事	・手術当日は絶飲食になるため夕食以降は間食等はお止め下さい。水分摂取はお茶、水のみでお願いします。	・手術前は絶飲食となります。水分は10時まで可能です。	・手術後は飲食をしないで下さい。翌日朝まで絶飲食となります。	・朝に水分の飲み込みが行えるかチェックしてから飲食再開となります。	
4. 安静	・入院後は入浴することができないので、済ませてきて下さい。	・手術には車椅子で行きます。手術終了後はベッドに乗ったまま帰室する予定です。	・手術後3時間はベッドで休んで下さい。3時間以降は状態に応じて看護師の付き添いがあればトイレに歩いて行くことができます。眼帯をしているので転んだりしないように注意して下さい。 ・手術後のテレビ鑑賞は控えて下さい。 ・手術後に体位の指示があれば従って下さい。	・上のまぶたの裏側に傷があります。顔を拭くときには触らないように注意して下さい。 ・日常生活の制限があります。別紙を参考にして下さい。	
5. 看護師より	・入院時のご自身での運転は控えて下さい。 ・化粧やマニキュアはせずに来院して下さい。 ・入院時に普段飲んでいるお薬をお預かりしますのでお持ち下さい。 ・入院の説明を行います。その際に記入してきて頂いた書類をお預かりします。 ・クリーンコットンを持参して下さい。	・手術前に時計や入れ歯、指輪などははずしておいてください。 ・手術前は病衣に着替え、下着以外は脱いで下さい。排尿をすませ、お部屋でお待ち下さい。	・視界が真っ暗になったり、真ん中が黒くぬけてみえる、視界の半分が見えなくなったりなど気になる症状があるときは速やかに看護師へ報告して下さい。	・点眼の前には忘れずに手洗いを行って下さい。 ・手術した目はクリーンコットンを使用して、清潔にして下さい。 ・診察が済んでから主治医の指示で退院が決まります。 ・看護師からの案内が終われば退院することができます。	